



תאנים

עונת הארייה סתוית נמצאת לקראת סיומה והתוצאות החקלאיות והשיווקיות טובות עד כה נארו ונשלחו לייצוא (בממוצע מכל שטחי התאנים בסתיו) כ-900 ק"ג לדונם במחירים של 17-22 ₪ למגדל.

עד סוף דצמבר במידה והטמפרטורות יישארו מעל 8-10 מעלות תמשך הארייה ותגיע ל-1 טון לדונם ייצוא. סה"כ הכמות מכל השטחים תגיע לכ-100 טון תאנים לייצוא. היתרון בארייה סתוית היא רמת מחירים גבוהה וקצב ארייה לא מהיר ופחת קטיף נמוך. קיימת בעיית קבלת צבע בחלק מהשטחים אולם בעיה זו אופיינית גם לארייה הקיציית.

נושא קבלת צבע כהה בתאנים הוא נושא פתיר ויגיע לכדי יישום מסחרי בשנים הקרובות וכל זאת בעזרת מחקרים המתבצעים על ידי משה פליישמן וזאב יבלוביץ ממכון וולקאני:

הגנת הצומח: הבעיה בתאנים הייתה ונשארה רישוי חומרים להדברת מזיקי התאנה. בשל מיעוט הסכמה של מגדלי התאנים בארץ ובשל מיעוט בתקציבים אין הדבר אפשרי לביצוע מה גם שחלק מחברות ההדברה לא מוצאות את הענף כאטרקטיבי מבחינה מסחרית ולכן כל נושא הרישוי לא מתבצע. בנוסף כל נושא גביית היטלים בענף אינו מושלם והרבה מגדלים אינם ששים לשלם מכספם בגין מחקרים ונושאים אחרים. הפיתרון להגנת הצומח הוא כיסוי ברשת המביא להפחתה בריסוסים נגד חלק מהמזיקים אולם גם כאן העלות הגבוהה מונעת מחקלאים רבים לבצע השקעה שכזאת.

מיכון: הכנסת מיכון חוסך כוח אדם מאושר גם בתאנים וניתן היום לרכוש מכונות למיין גודל פרי תוך עזרה (מענק מוגדל) של משרד החקלאות.

שיווק: תאנים טריות מבוקשות בכל העולם וגם בארץ, רמות המחירים השנה, בארייה הקיציית ובארייה הסתוית, היו טובים אך ניתן לומר באופן גורף כי עדיף לארוז בסתיו שכן בתקופה זאת המחירים הם תמיד בעלייה והכמות הכללית אינה נופלת מהכמות בקיץ (פרי המיועד לייצוא)

הדרכה: אין היום הרבה מדריכי תאנים ולא תמיד הקיימים זמינים לכל מגדל אולם בגלל שינוי שיטת ההדרכה מדריכים יכולים להדריך בכל רחבי הארץ. על כן עליכם לתאם ביקור עם מדריך הגידול ואלו יגיעו אליכם בזמן שיקבע הבעיה היא הזמן ובכך חייבת להיות סובלנות כי כל המדריכים עוסקים בתחומים נוספים שגם להם ישנן בעיות דחופות.

לחקלאים המתכוננים לבצע ארייה קיציית: תחילת גיזום באמצע ינואר וריסוס דורנקס 4% + שטח לאחר גיזום.

בארגמנית (ברזילאית) יש לבצע גיזום על 2 עיניים במטע צפוף (160 עץ לדונם) יעד מטרה 35-40 ענפי פרי לעץ ובמטע מרווח (80 עץ לדונם) יעד מטרה 75-80 ענפי פרי.

בנצרתית ובזני בכורות אחרים יש להשאיר את הענפים משנה שעברה ולבצע ריסוס בדורמקס 4% באמצע ינואר

ריסוס בג'ברלין בריכוז 40 ח"מ החל משלב הופעת הפגות (גודל של 2 מ"מ) וריסוס שני שבוע אחריו באותו המינן.

השקייה: התחלת השקייה רק לאחר הופעת הפגות (עפ"ר לאחר הופעת העלה ה-5 על הענף)

רשם: חיים אורן רפרנט לתאנה שה"מ