



משרד החקלאות ופתוח הכפר  
שירות ההדרכה והמקצוע  
אגף הירקות וגד"ש  
הגנת הצומח

ח' שבט, תשע"ב, 01/02/2012

מבק אנדפי תפנימ:

## כשותית" - מחלה חדשה באידוף בליף צדכונמ והמלצות חדשות



למגדלים שלום,

**צדכונמ** - מאז הגילוי הראשון (לפני כחודש) של פטריית הכשותית *Peronospora sp.* בבזיל בשלוש

חממות בעמק המעינות, אירוע נוסף בעין הבשור ועוד אחד בכיכר סדום. עד כה הפטריה היתה מוכרת רק באירופה ובארה"ב ולראשונה נמצאה בישראל בצמחי בזיל הגדלים בחממות. תסמיני המחלה מתבטאים בעיוות קל, שינוי צבע (ירוק בהיר) והופעת נביגה בצבע כהה בצד התחתון של העלים. בנגיעות קשה נושרים העלים. התפשטות המחלה עלולה להיות מהירה ביותר (אילוח כל בית הצמיחה תוך 48 שעות!).

לאור העובדה שזו מחלה מגפתית שמתפשטת במהירות וכעת הופיעה בכל הארץ, מומלץ לכל מגדלי הבזיל לרסס אחת לשבוע משתילה, בתכשירים קוטלי כשותית מורשים כטיפול מניעתי.



משרד החקלאות ופתוח הכפר  
שירות ההדרכה והמקצוע  
אגף הירקות וגד"ש  
הגנת הצומח

## המלצות הדברה

לחות גבוהה מעודדת התבססות המחלה. אוורור וייבוש מסייעים בעצירת המחלה. קוטלי כשותית מניעתיים כגון קנון ואקרובט נמצאו יעילים בהדברת המחלה אך לא בהכחדתה. **בהופעת נגיעות**, מומלץ שילוב **תכשירים תגובתיים בהתאם לרישוי וימי המתנה כגון אקרובט**, רידומיל, מנקור ועוד להדברה טובה יותר של הפטריה. ניתן להתייעץ עם צוות ההדרכה בכל עת.

בברכה,

שמעון ביטון ודוד סילברמן, שה"מ

כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד.

